روفاست 75 EW

المبيد الأحدث و الأفعل ضد العناكب و التريبس

- المادة الفعالة : أكريناترين
- الصيغة : محلول سائل مائي

- مقادير الاستعمال :

الزراعات	الحشرات الضارة	الجرعة	مدة قبل الجني
الخضروات	العناكب و التريبس	80 - 100 ملل/هل	3 أيام
الأشجار المثمرة	العناكب التريبس	0,6 - 1 ل/ هكتار	14 يوم
الكروم	العناكب	0,4 - 0,6 ل/ هكتار	21 يوم
الحمضيات	العناكب	0,6 - 0,8 ل/ هكتار	30يوم

- الخصائص و طريقة التأثير :

يؤثر روفاست بالملامسة.
تأثيره العنكبوتي يطبق على جميع المراحل المتحركة: اليرقة و البالغة.
يتميز روفاست بخاصيتين مكملتين :
- تأثير صدام
- استمرارية التأثير.
بالإضافة إلى المظاهر الناتجة عن تأثير الصدام,نلاحظ نشاط متبقي على استعمالات أخرى والأجيال اللاحقة أيضا.

- المميزات :

روفاست مبيد حشري عنكبوتي ذو فعالية كبيرة على العناكب الصفراء والحمراء في الكروم,الأشجار المثمرة الحمضيات و الخضر .
روفاست يملك فعالية عالية جداً ضد التربس على جميع الزراعات
يحتوي روفاست على خاصيات حشرية ضد السيكادال

- الاحتياطات :

الأشجار المثمرة:
ضد عناكب أشجار التفاح و الأجاص (ذات البذرة), التدخل الأفضل يكون على عتبة وجود 3 أشكال متحركة على الورقة و ذلك بمقدار 0.6 - 1ل/هكتار.
روفاست يحافظ على العناكب النافعة مثل *Neoseiulus californicus*.
مدة قبل الجني 14 يوم.
ضد تريبس أشجار الخوخ و النكتارين, يستعمل روفاست عند ظهور أول تريبس بمقدار 60 - 100 ملل/هل.
مدة قبل الجني 7أيام.

الكروم:
يستعمل روفاست ضد العناكب و يكون العلاج في فصل الربيع أو على حد 3-2 أشكال متحركة على الورقة بمقدار 40 - 60 ملل/هل حسب الكروم.
ضد السيكادال يجب اتباع ارشادات حماية النبات.
مدة قبل الجني21 يوم.

الخضروات:
روفاست ذو فعالية جيدة على التريبس و بالخصوص *Frankliniella occidentalis*
يطبق روفاست في برنامج أين يتم التناوب في العائلات الكيميائية بمقدار 0.8-1ل/هكتار.
التدخل يكون عند ظهور أول تريبس .

- الانتقائية:

روفاست مبيد انتقائي مثالي للكروم,الأشجار المثمرة (ذات النواة , ذات البذور) و الخضروات.

- طريقة الاستعمال:

روفاست سهل الذوبان في الماء.
يملأ نصف الرشاش بالماء ثم تضاف كمية روفاست المنصوح بها بعدها نكمل ملء الرشاش بالماء.
عملية الرش عامل مهم في نجاح المكافحة ضد الحشرات و لهذا لابد أن تكون كمية الماء في الرشاش, ضغطه و سرعته مدروسة لكي نحصل على التغطية الكاملة لكل أوراق النبات بالمبيد.
ينصح استعمال الروفاست على الأوراق غير المبللة.

Distributeur exclusif : SARL CASAP
06 rue Alloua AEK Kouba, Algérie
Tel : 021 28 30 20 / 021 29 03 43
Fax : 021 46 22 80
info@casapdz.com / www.casapdz.com

CHEMINOVA

Rufast 75 EW

Votre meilleur outil pout lutter contre les Thrips et les Acariens

Formulation : Emulsion aqueuse
Matière active : Acrinathrine

Ravageurs et doses :

Cultures	Ravageurs	Doses	D.A.R
Cultures maraichères	Acariens et thrips	80 - 100 ml/hl	3 Jours
Arbres fruitiers	Acariens Thrips	0,6 - 1 L/ha	14 Jours
Vigne	Acariens	0,4 - 0,6 L/ha	21 Jours
Agrumes	Acariens	0,6 - 0,8L/ha	30Jours

Performances :

Rufast est un insecticide-acaricide ayant une grande efficacité sur les acariens jaunes rouges de la vigne, des cultures maraichères et des arbres fruitiers.
Rufast possède une grande efficacité contre les thrips sur différentes cultures.
Rufast possède des propriétés insecticides sur des cibles particulières telles que les cicadelles et les thrips.

Propriété et Mode d'emploi :

Rufast agit essentiellement par contact.
Son action acaricides s'exerce sur l'ensemble des formes mobiles : larve et adulte.
Rufast se caractérise par deux propriétés complémentaires :
-Action de choc
-Persistance d'action.
Outre le retard de manifestation permis par l'action de choc, on observe une activité résiduelles sur d'éventuelles recolonisations ainsi que sur la descendance des adultes suivant.

Préconisations :

Arboricultures fruitiers :
contre les acariens du pommier, du poirier et d'autres arbres fruitiers à pépins.
L'intervention optimale fera sur des seuils de populations de l'ordre de 3 formes mobiles par feuille par la dose de 0.6-1L/ha.
Rufast respecte les acariens prédateurs tels que le *Neoseiulus californicus.*
*Le délai d'utilisation avant la récolte est de 14 Jours.
*Sur thrips des pêches et des nectarines, intervenir avec Rufast dés la détection des premiers thrips à la dose de 60 ml -100 ml/hl.
*Le délai d'utilisation avant la récolte est de 7 jours.

La vigne :
Contre les acariens
Rufast s'applique en traitement au printemps ou sur seuil de 2-3 formes mobiles par feuille a une dose de 40-60 ml/hl selon les vignobles.
Sur cicadelles suivre les avertissements de la protection des végétaux.
Le délai avant la Récolte est de 21 jours.

Cultures maraichères :
Rufast présente une remarquable efficacité sur thrips et plus particulièrement sur thrips *Frankliniella occidentalis.*
Rufast s'applique dans un programme où les familles chimiques s'alternent, par la dose de 0.8-1L/ha.
L'intervention aura lieu dés l'apparition des premiers thrips.

Sélectivité :
Rufast est parfaitement sélectif de la Vigne, Arbre fruitiers à pépins et à noyaux ainsi que des cultures maraichères.

Mode d'application :

Rufast est un concentré émulsionnable, dont la dilution dans l'eau est aisée.

Rufast s'ajoute dans la cuve du pulvérisateur, en cour de remplissage.

La pulvérisation est un facteur de réussite des applications Rufast, il est donc nécessaire que le volume de bouillie, la pression de traitement et la vitesse d'avancement soient correctement réglés pour assurer une couverture régulière de l'ensemble du feuillage ciblé.Il est recommandé d'intervenir sur feuillage sèche.

Distributeur exclusif : SARL CASAP
06 rue Alloua AEK Kouba, Algérie
Tel : 021 28 30 20 / 021 29 03 43
Fax : 021 46 22 80
info@casapdz.com / www.casapdz.com

CHEMINOVA